

Une cohabitation ancestrale

La grande majorité des patrimoines bâtis présents sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord répond aux besoins de l'activité agricole. Etables, écuries, basses-cours, pigeonniers sont partie intégrante des ensembles construits. Il arrivait même qu'ils soient bâtis avant la partie habitable.

Et aujourd'hui encore :

DANS LES GRENIERS ...

Les petits mammifères y trouvent un abri favorable pour leur période d'hibernation. Parmi eux : **les chauves souris** s'y installent en solitaire en hiver, pour hiberner, et en colonie au printemps, pour les périodes de gestation et de mise bas. En France, toutes les chauves-souris sont protégées. Inoffensives, insectivores, produisant un guano utilisable au potager (puissant fertilisant), elles sont un atout pour vos maisons et vos jardins.

Les oiseaux : hirondelles, martinets, moineaux, chouettes nichent volontier dans les charpentes.



Chauves-souris :

- Réaliser les travaux qui pourraient les déranger, entre octobre et mars, en dehors des périodes où les chauves-souris sont présentes,
- Utiliser des produits non toxiques pour le traitement des charpentes,
- Créer ou conserver quelques disjointements dans les murs ou sous les ponts,
- Préserver l'accès aux combles et aux caves.

Nicolas DE FAVERI - 2014-

DANS LE JARDIN ...

Lors de l'aménagement de vos espaces plantés, il est important de **favoriser la biodiversité**. Planter des **espèces locales adaptées à la nature du sol** (cf. Guides Pratiques Tome 1 & 2 : les plantes du Nord-Est de la France) en supprimant les plantes exotiques envahissantes. Favoriser la création d'habitats pour **la faune** (chauves-souris, oiseaux, hérissons, belettes, insectes auxiliaires). Adopter une gestion durable des espaces en limitant les pesticides et en utilisant les auxiliaires.

https://www.plante-et-cite.fr/data/fichiers_ressources/info/5_flore_exotique_envahissante.pdf

DANS LE VERGER ...

Les bouleversements de nos **modes de vie** et la pression exercée par **l'agriculture intensive et l'urbanisation** entraînent une **disparition des vergers hautes tiges**.

Ceux-ci constituent des **milieux naturels riches** par l'association arbres / prairies. **Si les prairies sont gérées de manière extensive, une flore très diversifiée s'y développe**. On y trouve, en plus de la **faune** du quotidien (pic vert, mésange, fouine), des espèces plus rares (chouette chevêche, torcol fourmilier) et jusqu'à **1000 espèces d'insectes**.



Campagnol



Chouette chevêche

FAUNE et PATRIMOINE BÂTI

Nichoires
recoins

haies
abris

accueil